

Studienübersicht

offene Studien - Stand 30.06.2020

	Entität	Studienname (Krüzel)	Kurzbeschreibung	Studien- typ	Studienname (Langversion), ggf. EIDRACT Nr. Sponsor	Hauptprüfer	Rekrutierende Standorte	Rekrutierung seit	Anzahl Studienpatienten
1	CLL	CLL-Register	Patienten mit gesicherter CLL, alle Krankheitsphasen (ausgen. Hirnmetastasen)	Register	Langzeit-Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-PLL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL und Richter Transformation Register der Deutschen CLL-Studiengruppe (DCLLSG) Köln Universität zu Köln	Dr. Clemens Schulte	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2014	263
2	Immunglobulinmangel	PRIVIGEN	Anwendung von Privigen® gem. Fachinformation, retrospektiv bis 1.1.2015	NIS	Anwendung von Privigen®: Eine nicht interventionelle Beobachtungsstudie (IgPro10_5001) CSL Behring	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2016	20
3	Immunthrombozytopenie	RISA	Anwendung von Revolade® bei Patienten mit primärer cITP	NIS	Revolade® in patients with chronic Immune thrombocytopenia (cITP) - an observational study of the TPO receptor agonist Eltrombopag in daily practice Novartis Pharma GmbH	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2016	9
4	Kolon-Ca Stadium I, II und III	COLOPREDICT	Einschluss prospektiv und retrospektiv bis ED 2014	NIS	Retro- und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I, II + III Institut für Pathologie, Universität Bochum	Dr. Clemens Schulte	Brackel	2018	23

5	Kolorektales Karzinom, metastasiert, RAS-Wildtyp	PANAMA	1st line-Therapie mit mFOLFOX6 + Panitumumab , Maintenance mit 5-FUFA + Panitumumab vs. 5-FUFA , Reinduktion mit mFOLFOX6 + Panitumumab vs. mFOLFOX6	II	Randomized Phase II study for evaluation of efficacy and safety of maintenance treatment with 5-FU/FA plus panitumumab vs. 5-FU/FA alone after prior induction treatment with mFOLFOX6 plus panitumumab and re-induction with mFOLFOX6 plus panitumumab in case of progression for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer. EudraCT Nr. 2012-005422-30 AIO-Studien-gGmbH	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2015	5
6	Kolorektales Karzinom metast.	TATCIC	Lonsurf prospektiv; Patienten.,die bereits mit FLOT, FOLFIRI, Anti-VEGF oder Anti-EGFR therapiert wurden od. für diese Therapien nicht geeignet sind	NIS	A non-interventional study to assess effectiveness and safety of trifluridin/tipiracil in patients with metastatic colorectal cancer IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2018	10
7	Magen-Ca. molekulargenetische Untersuchung		Molekulargenetische Untersuchung (Studie in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Fridrich-Wilhelms-Universität Bonn)	DFG-Projekt	Molekulargenetische Untersuchung (Studie in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Fridrich-Wilhelms-Universität Bonn)	Dr. Johannes Schumacher	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2015	60
8	Magen-Ca., Ösophagus-Ca, Ca. des gastroösoph. Übergangs	SAPHIR	metast. Plattenepithel-Ca. oder Adeno-Ca., max. 4 Wo retrospektiv, 1st line	Register	Clinical Reasearch Platform for molecular testing, treatment, quality of life and outcome of patients with esophageal, gastric or gastroesophageal junction cancer requiring palliative systemic therapy IOMEDICO AG	Dr. Clemens Schulte	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2019	0
9	Mamma-Ca. lokal fortgeschr. od. metastasiert, HER2-neg., HR-pos.	RIBANNA	Kisqaly prospektiv, HR-pos/Her2-neg, First line, Ribociclib + Aromatasehemmer oder Ribociclib + Fulvestrant oder endokrine Monotherapie oder Chemotherapie	NIS	Eine nicht-interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/HER2- lokal fortgeschrittenen/ metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine Novartis Pharma GmbH	Sandra Ketzler-Henkel	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2019	4

10	Mamma-Ca. fortgeschr., inoperabel od. metast.	OPAL	HR-pos/Her2-neg; Her2-pos oder triple neg.; 1st line system. Therapie; Einschluss bis 6 Wochen retrosp., für Fragebogenprojekt Einverst. für spätestens zu Therapiestart	NIS	Registerplattform Mammakarzinom Treatment and outcome of patients with advanced breast cancer: clinical research platform for real world data IOMEDICO AG	Sandra Ketzler- Henkel	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2018	12
11	Multiples Myelom	HD7	Assoziiertes Zentrum Pat. mit neu diagnostiziertem MM; Induktion mit RVd oder RVd+Isatuximab, Knochenmark- transplantation, Erhaltung mit RVd oder RVd+Isatuximab	III	A randomized phase III trial assessing the benefit of the addition of isatuximab to lenalidomide/bortezomib/dexamethasone (RVd) induction and lenalidomide maintenance in patients with newly diagnosed multiple myeloma EudraCT Nr. 2017-004768-37 KKS Heidelberg und GMMG	Dr. Christiane Bernhardt	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2020	0
12	Multiples Myelom vor 1st od. 2nd line	MYRIAM	Pat. mit neu diagnostiziertem MM vor der 1st line od. Pat. zu Beginn der 2nd line, Schwerpunkt: PRO bei 1st line	Register	Clinical research platform for molecular testing, treatment and outcome of patients with Multiple Myeloma (Myeloma Registry Platform: MYRIAM) IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2017	44
13	NSCLC Stadium IIIB-IV SCLC	CRISP	Biomarker-Testung, Re-Testung, Therapieent-scheidungen und Outcome	NIS	Clinical research platform into molecular testing, treatment and outcome of non-small cell lung carcinoma patients AIO-Studien-gGmbH	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2016	112
14	Nierenzell-Ca. fortgeschr., inoperabel oder metastasiert	CARAT	Einschluss 1st line prospektiv oder bis zu 12 Wochen retrospektiv	NIS	Registerplattform Nierenzellkarzinom Clinical Research Platform On Renal Cell Carcinoma Treatment And Outcome IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2018	8
15	Pankreas-Ca. metastasiert oder lokal inoperabel	Tumorregister Pankreas-Ca.	Einschluss 1st line, max. 2 Wochen retrospektiv	Register	Klinisches Register zur Darstellung der Behandlungsrealität und der Therapiesequenzen bei operablem, lokalem oder metastasiertem / lokal inoperablem Pankreaskarzinom in Deutschland - eine multizentrische, epidemiologische Erhebung IOMEDICO AG	Dr. Clemens Schulte	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2019	0

16	Diverse Entitäten (außer AML, CML, MDS, MPN)	TIDO	Ferinject Phase 1: Pat. mit Erstkontakt bei gesicherter onkolog. od. hämatolog. Erkrankung; 28 Tage retrosp. Phase 2: TSAT < 20%, Ferritin < 800 ng/ml, Systemther, Gabe von Ferinject	NIS	TSAT als diagnostischer Marker für Eisenmangel bei onkologischen Patienten - Prävalenz von Eisenmangel sowie Wirkung und Verträglichkeit einer Behandlung mit Eisencarboxymaltose (FCM) VIFOR PHARMA	Dr. Clemens Schulte	Brackel, Hörde, Kirchlinde	2019	0
----	--	------	---	-----	--	------------------------	----------------------------------	------	---